

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS PREALABLES A UNE SÉANCE DE MAQUILLAGE PERMANENT

Vous désirez prendre 1 RDV afin d'effectuer un maquillage permanent, pour ce faire voici quelques recommandations à suivre afin que la séance se passe dans les meilleures conditions possible pour un résultat optimum.

*En tant que cliente vous bénéficierez d'une retouche offerte, qui se tiendra **3 à 4 semaines** après votre intervention.*

*Par la suite et afin de maintenir une qualité irréprochable de votre **Maquillage Permanent**, vous devrez effectuer une retouche tous les **12 à 18 mois** (En effet, les couleurs s'atténuent au fil des mois) Afin de garder des lignes parfaites et une intensité de couleur satisfaisante, la retouche est donc conseillée.*

*Une retouche faite tous les **6 à 18 mois** vous permettra d'économiser **50 % sur le tarif de la prestation** à l'inverse si aucun entretien n'est effectué, vous perdrez votre tracé au bout de 3 à 5 ans sans disparaître totalement pour autant.*

PRECAUTIONS - RECOMMANDATIONS :

*Préalablement à votre séance de maquillage permanent et afin d'en assurer la longévité, il convient de respecter quelques consignes simples, qui sont à effectuer peu importe la zone concernée, et durant **les 3 jours qui précèdent l'intervention**.*

- 1- Prendre de l'**Arnicha* 9ch** (à raison de 3 doses par jour pendant 3 jours)*
- 2- Ne surtout pas prendre d'aspirine durant les **5 jours** qui précèdent l'intervention (celles-ci sont juste des recommandations sans obligation de votre part)*

TRAITEMENTS PARTICULIERS POUR LA BOUCHE SI VOUS ETES SUJET AUX BOUTONS DE FIEVRE :

*Prendre obligatoirement un traitement tel que **Zovirax* 2 jours avant, le jour même et 2 jours après***

Dans tous les cas, Je décline toute responsabilité si une réaction survenait à l'issu de l'un des traitements préconisé dans le présent feuillet

A quoi dois-je faire attention avant de venir pour un traitement de maquillage permanent?

- Pas de consommation d'alcool au moins 24h avant le traitement et préférence 48h, ceci peut fortement augmenter la sensibilité et l'irrigation sanguine de la peau (même s'il s'agit que d'un verre) avec conséquence de rendre le traitement plus désagréable et que pigment par la trop forte irrigation se fixe moins bien.*
- Le jour du traitement, essayez aussi de limiter la boisson de café ou de l'éviter, le café agit comme excitant et peut diminuer l'action des anesthésiques.*
- Si possible, boire un verre de jus de pommes une heure avant le traitement, ce qui épaissit un peu le sang, diminue l'irrigation sanguine qui diminue ainsi la sensibilité et procure une meilleure fixation du pigment.*
- De préférence 24 h et encore mieux 48h avant le traitement ne pas prendre d'aspirine. D'autres antidouleurs qui ne contiennent pas d'aspirine (acide acétylsalicylique) comme **Perdolan, Dafalgan, Paracetamol, etc.** sont autorisés. (Voir aussi la question 3)*
- Essayez autant que possible de vous détendre, le stress stimule la production d'adrénaline, ce qui ne rend pas le traitement plus agréable. Faites confiance à votre spécialiste en maquillage permanent, j'exécute plusieurs traitements par jour*